



10% 彩色（蓝色）PAGE 胶一步法快速制备试剂盒

产品组成:

组分	PA321-01(10% Page Gel)
上层胶溶液	50 ml
彩色上层胶缓冲液（蓝）	50 ml (蓝色)
下层胶溶液	125 ml
下层胶缓冲液	125 ml
促凝剂	5 ml

保存条件: 促凝剂, -20°C保存, 12个月; 4°C保存, 至少3个月; 其他组分, 4°C/室温保存。

产品简介:

10% 彩色（蓝色）PAGE 胶一步法快速制备试剂盒采用预混液形式, 只需将试剂两两等体积混合, 加入促凝剂即可凝胶。上层胶缓冲液带有颜色, 不同胶浓度不同颜色, 用以区分不同凝胶和方便点样。

本试剂盒可制备伯乐 (1653311) Mini-PROTEAN® Spacer Plates with 1.0 mm Integrated Space 50 块, 具体配制的凝胶块数与凝胶厚度以及凝胶大小有关。

产品特点:

- 快速制备 PAGE 胶:** 只需将溶液两两混合, 加入促凝剂即可凝胶。
- 彩色上层胶:** 红, 蓝, 绿, 紫四种颜色上层胶, 方便上样和浓度识别。
- 条带清晰:** 蛋白条带清晰锐利。
- 无异味:** 无需添加 TEMED, 避免微腥臭味。

使用方法:

下层胶配方			
凝胶厚度	下层胶溶液	下层胶缓冲液	促凝剂
0.75 mm	2.0 ml	2.0 ml	40 μ l
1.00 mm	2.5 ml	2.5 ml	50 μ l
1.50 mm	4.0 ml	4.0 ml	80 μ l

上层胶配方			
凝胶厚度	上层胶溶液	彩色上层胶缓冲液	促凝剂
0.75 mm	1.0 ml	1.0 ml	20 μ l
1.00 mm	1.0 ml	1.0 ml	20 μ l
1.50 mm	1.5 ml	1.5 ml	30 μ l

(以制备一块 0.75/1.0/1.5 mm mini PAGE 胶为例。)

- 下层胶配制: 取等体积下层胶溶液和下层胶缓冲液, 各 2.0/2.5/4.0 ml, 混匀。
- 向步骤 1 的混合溶液中加入 40/50/80 μ l 的促凝剂, 立即充分混匀, 然后注入制胶玻璃板中。加入适量水或醇覆盖于下层胶之上。
注意: 此溶液为过量, 请勿全部注入。
- 待下层胶凝固后(约 15 min), 倒去上层水或醇。
注意: 当水(醇)和胶之间有一条折射线时, 说明胶已凝固。
- 取等体积上层胶溶液和彩色上层胶缓冲液, 各 1.0/1.0/1.5 mL, 混匀。
注意: 由于染料特殊理化性质, 使用前请摇匀。
- 向步骤 4 的混合溶液中加入 20/20/30 μ l 的促凝剂, 混匀, 注入制胶玻璃板中, 插入梳齿。
- 待上层胶凝固后(约 15 min), 拔去梳齿即可用于电泳。

注意事项:

- 促凝剂的使用量仅作参考, 实际用量可根据个人实验习惯和经验调整。加入较多量的促凝剂可加速凝胶, 反之亦然;
- 凝胶速度与温度有显著的正相关性。同等条件下, 温度越高, 凝胶速度越快, 室温过高时建议适当减小改良型促凝剂的用量; 相反, 如果室温较低, 可适当延长凝胶时间;
- 在配胶之前, 使胶溶液及缓冲液平衡到室温(如室温放置几分钟), 可有效避免凝胶中气泡的形成;
- 推荐电泳条件为: 150V, 约 50 min(或 200V, 约 35 min);
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
- 本产品仅限科研使用。